TUIN · TAXUSKEVER

Taxuskeverval en aaltjes tegen taxuskever

De taxuskever (gegroefde snuitkever) vreet 's nachts hapjes uit de bladranden. Zijn larven eten de wortels. De val pakt de kevers, de aaltjes pakken de larven in de grond.

VOORJAAR	NAJAAR	VAL WERKT	VAL VOCHTIG
april en mei	**augustus t/m oktober**	**vanaf 5 °C**	**ongeveer 6 weken**

EERST EVEN DIT

- Leg de val altijd met de groeven naar beneden. Daar zitten de aaltjes. De kevers raken besmet als ze eronder kruipen.
- Maak de val eerst nat. Dan zwelt de gel op en blijft hij in de groeven zitten.

Zo leg je de val

1 Maak de val nat

- Zet de val even onder de kraan of in een bak water, tot de gel in de groeven is opgezwollen.

2 Ruim andere schuilplekken op

- Haal losse potten, stenen en planken weg bij de plant. Dan kiezen de kevers voor jouw val.

3 Leg hem bij de plant

- Leg de val met de groeven naar beneden op de grond, dicht bij de stam van de plant met vraatschade.
- Kies een schaduwrijke plek en druk hem licht aan.
- Leg hem het liefst 's avonds neer. De kever is 's nachts actief en zoekt overdag een schuilplek.

4 Houd hem vochtig

- Kijk af en toe of hij nog vochtig is en besprenkel hem zo nodig.
- Laat hem ongeveer 6 weken liggen en kijk af en toe of er kevers onder zitten.

Goed om te weten

Aaltjes gieten tegen de larven

- Maak de grond rond de planten vochtig en gebruik geen chemische middelen.
- Roer het zakje aaltjes door 1 liter water en laat het even staan.
- Grote verpakking (vanaf 200 m²)? Gebruik dan een emmer met 10 liter water. Per gieter van 10 liter is dat 500 ml mengsel bij 200 m² (100 miljoen), 200 ml bij 500 m² (250 miljoen) en 100 ml bij 1000 m² (500 miljoen).
- Verdun tot 10 liter per 10 m² en giet het gelijkmatig rond de stam.
- Doe het 's avonds of bij bewolkt weer, als de bodem minimaal 12 °C is.
- Houd de grond 7 tot 14 dagen licht vochtig, niet nat. De eerste verbetering zie je na 2 tot 3 weken.

Zo herken je de taxuskever

Halfronde hapjes uit de bladranden. Dat is lelijk, maar zelden erg. De echte schade doen de larven aan de wortels: de plant verwelkt, verkleurt en kan doodgaan.

Combipakket taxuskever

Leg eerst de val en giet op dezelfde avond de aaltjes. Zo pak je de kevers en de larven tegelijk aan.

Dit gaat vaak mis

- De val met de groeven naar boven leggen.
- De val droog laten worden.
- De val in de volle zon leggen.
- Alleen de val gebruiken als de wortels al worden aangevreten.

Vragen

Hoeveel vallen heb ik nodig?

Leg er één bij elke plant met vraatschade.

Bewaren

Bewaar de val in de verpakking in de koelkast, tussen 4 en 8 °C, en niet in de vriezer. Gebruik hem zo snel mogelijk na ontvangst.